

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

CARACTERIZAÇÃO

Categoria profissional: Aux. de enfermagem Téc. de enfermagem Enfermeiro
Sexo: M F
Idade: ____ anos
Escolaridade: Ensino fundamental Ensino médio Graduação: _____
 pós-graduação (na área da Enfermagem)
Tempo de experiência na função: ____ anos
Tempo de exercício em UTI: ____ anos
Recebeu treinamentos em serviço sobre aspiração endotraqueal: Não Sim Quantas vezes: ____

QUESTIONÁRIO

QUANTO À PREPARAÇÃO DO PACIENTE PARA O PROCEDIMENTO DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL (AET):

1. Sempre explicar o procedimento ao paciente mesmo inconsciente ou sedado.
 Verdadeiro Falso Não sei
2. Deve-se interromper a dieta enteral antes da AET.
 Verdadeiro Falso Não sei
3. Na preparação para o evento de AET libera-se 100% de oxigênio em pacientes adultos por 30 a 60 segundos, especialmente em pacientes hipoxêmicos.
 Verdadeiro Falso Não sei
4. Marque com um X a(s) alternativa(s) correta(s):
O paciente necessita de AET quando:
 Queda da saturação de oxigênio e/ou valores de gases na gasometria arterial.
 Secreção visível nas vias aéreas.
 Inviabilidade do paciente para gerar uma tosse espontânea eficaz.
 Angústia respiratória aguda.
 Suspeita de aspiração de fluídos gástricos ou de vias aéreas superiores.
 Colheita de secreção para exame microbiológico.

COM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE AET:

5. A AET deve ser procedida em horários pré-estabelecidos, conforme prescrição do enfermeiro ou médico.
 Verdadeiro Falso Não sei
6. É recomendado a instilação rotineira de SF 0,9% no tubo antes da AET.
 Verdadeiro Falso Não sei
7. O cateter de aspiração ideal deve ocluir menos de 50% do lúmen (orifício) do tubo orotraqueal em adultos.
 Verdadeiro Falso Não sei
8. Indica-se que a introdução do cateter de aspiração (vácuo aberto) nas vias aéreas limita-se a no máximo 30 segundos.
 Verdadeiro Falso Não sei
9. O paciente deve ser acompanhado em oximetria de pulso antes, durante e após o procedimento.
 Verdadeiro Falso Não sei
10. Com o objetivo de remover maior quantidade de secreções o cateter deve ser inserido no tubo com o sistema de vácuo aberto.
 Verdadeiro Falso Não sei

NO QUE TANGE AOS CUIDADOS DE ACOMPANHAMENTO PÓS AET:

11. Marque com um X a(s) alternativa(s) correta(s):

Com o objetivo de detectar precocemente eventuais reações adversas, quais parâmetros devem ser monitorizados durante o procedimento de AET?

- Saturação de O₂
- Frequência cardíaca
- Reações do paciente
- Pressão arterial
- Nível de consciência

12. Marque com um X a(s) alternativa(s) correta(s):

Quais as principais possíveis conseqüências ou reações adversas pós AET?

- Aumento da pressão arterial
- Aumento da pressão intracraniana
- Hipoxemia
- Arritmias cardíacas
- Parada cardíaca
- Parada respiratória
- Broncoespasmo
- Alterações neurológicas
- Atelectasias
- Infecção nosocomial
- Hiperestimulação vagal
- Danos a árvore traqueobrônquica
- Sangramentos
- Instabilidade cardiovascular
- Morte

13. A hiperventilação (aumento da quantidade de ar que ventila os pulmões, seja pelo aumento da frequência respiratória ou fluxo inspiratório), não deve ser rotineiramente utilizada.

- Verdadeiro
- Falso
- Não sei

PRÁTICAS PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO

14. A lavagem das mãos antes e após a AET, o uso de luvas, óculos, máscara e avental são medidas assépticas consideradas essenciais para evitar infecções e promover a saúde ocupacional.

- Verdadeiro
- Falso
- Não sei

15. A esterilidade do cateter de aspiração deve ser mantida até sua inserção no interior das vias aéreas.

- Verdadeiro
- Falso
- Não sei

16. A ordem traqueia, boca e nariz deve se atendida na aspiração de vias aéreas em pacientes intubados.

- Verdadeiro
- Falso
- Não sei

IMPRESSÃO DOS PROFISSIONAIS

17. Tem dificuldade (s) em algum (ns) cuidado (s) com o cliente em uso de vias aéreas artificiais?

- Sim
- Não

Quais?

- Fixação
- Posicionamento
- Higiene oral
- Aspiração
- Pressão do *cuff*
- Mobilização no leito
- Outras: _____