



Universidade Federal Fluminense

ESCUELA DE ENFERMERÍA  
AURORA DE AFONSO COSTA



Notas Previas



## Ideación suicida entre travestis y transexuales: estudio analítico y de las representaciones sociales

Glauber Weder dos Santos Silva<sup>1</sup>, Romeika Carla Ferreira de Sena<sup>1</sup>,  
Suerda Lillian da Fonseca Lins<sup>1</sup>, Francisco Arnaldo Nunes de Miranda<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidad Federal de Rio Grande do Norte

### RESUMEN

**Objetivo:** analizar la asociación entre ideación suicida suicidio y factores de riesgo para suicidio y sus representaciones sociales en la vida de travestis y transexuales. **Método:** estudio con abordaje cuantitativo del tipo analítico y cualitativo del tipo exploratorio, desarrollado con travestis y transexuales asociados a una organización no gubernamental de Rio Grande do Norte por medio de entrevista semiestructurada. Los datos cuantitativos serán analizados por estadística inferencial con aplicación de los testes chi-cuadrado, Mann Whitney y correlación de Pearson. Los cualitativos serán interpretados por análisis de contenido y de las representaciones sociales. **Resultados esperados:** se busca identificar ideación suicida, estado depresivo y representaciones sociales sobre el suicidio para travestis y transexuales, principalmente en lo que concierne a la promoción de la salud mental por medio de la identificación de factores de riesgo y signos para el suicidio, reducción de daños en las experiencias experimentadas en el transito del género, y prevención en salud en los aspectos socio cognitivos que rodea el fenómeno.

**Descriptor:** Atención a la Salud; Personas Transgénero; Salud Mental; Suicidio.

## SITUACIÓN-PROBLEMA Y SU SIGNIFICANCIA

Los fenómenos involucrando depresión e ideación suicida están cada vez más presentes en la sociedad contemporánea, caracterizándose como un grave problema de la salud pública. Se constata que más de 800 mil personas cometen suicidio por año en el mundo: una persona cada cuarenta segundos, siendo la segunda principal causa de muerte entre jóvenes de 15-29 años. Se proyecta que, para 2020, más de un millón y medio de personas irán a cometer suicidio en el mundo y que el número de tentativas sea 20 veces mayor<sup>(1)</sup>.

Indudablemente, para el público de travestis y transexuales, los preconceptos que les son atribuidos (violencia familiar y extra familiar, abandono del sistema escolar y problemas biológicos relacionados al proceso de cambios corporales) tiene un carácter sociologizante y agravante en la construcción de ideación suicida<sup>(2)</sup>.

Un estudio con personas transexuales y en tránsito de género realizado en los Estados Unidos evidenció que más de 41% de la muestra (n= 6.456) ya había intentando suicidio, siendo hasta el momento el mayor y uno de los pocos estudios desarrollado con este público<sup>(3)</sup>. Datos científicos que tengan de foco la salud mental de travestis y transexuales son ausentes, abandonados y poco estudiados en Brasil.

## PREGUNTAS GUÍA

¿Existe asociación entre la ideación suicida con depresión y los factores de riesgo de mayor prevalencia para suicidio entre el público de travestis y transexuales? ¿Cuáles son las representaciones sociales sobre suicidio que influyen esta población a cometerlo?

## OBJETIVO GENERAL

Analizar la asociación entre ideación suicida y sus factores de riesgo para suicidio y las representaciones sociales del suicidio en la vida de travestis y transexuales.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y clasificar los participantes cuanto a la presencia de ideación suicida;
- Identificar depresión y factores de riesgo para el suicidio;
- Verificar la asociación entre ideación suicida, estados depresivos y factores de riesgo;
- Identificar las representaciones sociales de los participantes sobre el suicidio;
- Comparar las representaciones sociales entre participantes con y sin ideación suicida.

## MÉTODO

El presente estudio se diseña metodológicamente como una investigación de abordaje cuantitativo del tipo analítico, y cualitativo del tipo exploratorio, que será desarrollado en una organización no gubernamental (ONG) de travestis y transexuales del estado de Rio Grande del Norte.

La población del estudio fue constituida por las 58 personas transgénero asociadas a la ONG colaboradora de este estudio. La muestra, por conveniencia, fue determinada por la aplicación de los siguientes criterios de selección: inclusión de mayores de 18 años y exclusión de sujetos que no estén en Rio Grande del Norte o que se asocien a la ONG durante la colecta de datos.

Para la colecta de datos, se optó por adoptar cuatro instrumentos específicos para alcanzar

Silva GWS Sena RCF, Lins SLF, Miranda FAN. Suicidal ideation among transvestites and transsexuals: a social representations and analytical study. Online braz j nurs [internet] 2016 Oct [cited year month day]; 15 (suppl):501-504. Available from: <http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5591>

los objetivos propuestos que, aunque distintos técnica y conceptualmente, se complementan:

1. Escala de Ideación Suicida de Beck (validado);
2. Inventario de Depresión de Beck (validado);
3. Cuestionario con preguntas cerradas, construido por los autores, basado en revisión de literatura para identificación de factores de riesgo asociados a la ideación suicida;
4. Entrevista semiestructurada para aprender las representaciones sociales.

La colecta de datos ocurrió entre marzo y junio de 2016, con financiamiento propio. Los datos cuantitativos serán sometidos al programa SPSS 20.0 y analizados de forma descriptiva, con frecuencia absoluta y relativa, media de los escores de las variables y análisis inferencial en los cruzamientos de las variables, con nivel de significancia estadística de  $p$ -valor  $< 0,05$  y aplicación de los testes chi-cuadrado, Mann Whitney y correlación decon Pearson.

Los datos cualitativos serán preparados constituyendo un *corpus* textual alcanzado por la entrevista semiestructurada, que recibirá tres tipos de tratamiento: análisis de contenido propuesta por Laurence Bardin; análisis lexical por medio do *software Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segments de Texte* (ALCESTE); y análisis de representaciones sociales, según la teoría de Serge Moscovici.

La investigación propuesta es un proyecto de disertación de Maestría Académica del Programa de Pos-Graduación en Enfermería de la Universidad Federal de Rio Grande del Norte, aprobada por el Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos, obteniendo parecer favorable nº 1.314.559 de 09 de noviembre de 2015, respetándose las normas y aspectos éticos recomendados por la Resolución 466/2012 del Consejo Nacional de Salud.

## RESULTADOS ESPERADOS

Se busca identificar ideación suicida, estado depresivo y representaciones sociales sobre el suicidio para travestis y transexuales, principalmente en lo que concierne a la promoción de la salud mental por medio de la identificación de factores de riesgo y signos para el suicidio en ese grupo, reducción de daños en las experiencias vividas en el tránsito del género y prevención de la salud en los aspectos socio cognitivos que rodean el fenómeno.

## CITAS

1. Botega NJ. Comportamento suicida: epidemiologia. *Psicol. USP* [Internet]. 2014 [cited 2016 may 30];25(3):231-36. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/pusp/v25n3/0103-6564-pusp-25-03-0231.pdf>
2. Silva GWS, Souza EFL, Sena RCF, Moura IBL, Sobreira MVS, Miranda FAN. Cases of violence involving transvestites and transsexuals in a northeastern Brazilian city. *Rev Gaúcha Enferm* [Internet]. 2016 jun [cited 2016 may 30];37(2):e56407. Available from: [http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v37n2/en\\_0102-6933-rgenf-1983-144720160256407.pdf](http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v37n2/en_0102-6933-rgenf-1983-144720160256407.pdf)
3. Haas AP, Rodgers PL, Herman JL. Suicide attempts among transgender and gender non-conforming adults. Los Angeles, Califórnia: The Williams Institute e American Foundation for Suicide Prevention; 2014. [cited 2016 may 30] Available from: <http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-Report-Final.pdf>

---

Todos los autores participaron de las fases de esa publicación en una o más etapas a continuación de acuerdo con las recomendaciones del International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, 2013): (a) participación substancial en la concepción o confección del manuscrito o de la recolecta, análisis o interpretación de los datos; (b) elaboración del trabajo o realización de la revisión crítica del contenido intelectual; (c) aprobación de la versión sometida. Todos los autores declaran para los debidos fines que es de su responsabilidad el contenido relacionado con todos los aspectos del manuscrito sometido al OBJN. Garantizan que las cuestiones relacionadas con la exactitud o integridad de cualquier parte del artículo fueron debidamente investigadas y resueltas. Eximiendo por lo tanto el OBJN de cualquier participación solidaria en eventuales procesos judiciales sobre la materia en aprecio. Todos los autores declaran que no poseen conflicto de intereses, de orden financiera o de relacionamiento, que inflencie la redacción y/o interpretación de los resultados. Esa declaración fue firmada digitalmente por todos los autores conforme recomendación del ICMJE cuyo modelo está disponible en [http://www.objnursing.uff.br/normas/DUDE\\_final\\_13-06-2013.pdf](http://www.objnursing.uff.br/normas/DUDE_final_13-06-2013.pdf)

---

Recibido: 01/06/2016  
Revisado: 12/08/2016  
Aprobado: 12/08/2016